


# Pillnitzer Oldies

Bewährte bodendeckende Stauden für sonnige Standorte





## Vorteile bei der Verwendung von Stauden als Bodendecker:

- Attraktivität der Fläche wird erhöht
- Große Vielfalt an Blattformen, Farben, Blüten, Früchten
- Insektenfreundlich
- Ökologisch wertvoll durch assimilierende und transpirierende Blattfläche
- Verhinderung von Wasser- und Winderosionen
- Austrocknen der Flächen wird reduziert (Bewässerungsaufwand sinkt)
- Reduzierung des Pflegeaufwandes (Beikraut, Hacken...)





## Bodendeckende Stauden im Versuchsfeld

### Sortimentssichtung seit 1999

- Pflanzung seit 1999; Ergänzungen laufend
- Standort vollsonnig
- Parzellengröße: 1.5 x 1.5m (2,25m<sup>2</sup>) 36 Pflanzen (9er Topf) = **16 Pfl./m<sup>2</sup>**
- Parzellengröße: 1 x 1m (1m<sup>2</sup>) (9er Topf) = **12-16 Pfl./m<sup>2</sup>**
- Bewässerung nur im Pflanzjahr
- Keine Nachpflanzung
- Kein Pflanzenschutz
- Bonitur: Deckungsgrad, saisonales Erscheinungsbild, Höhe, Ausbreitung, Blüte/Frucht, Gesundheit, Winterbild
- Boniturtermine: mind. 1 x monatlich
- Photodokumentation



# Arabis procurrens

## Gänsekresse







## Arabis procurrens

1999 - 2023

- Karpaten, Balkan (Bergland, Hochgebirge)
- 10 - 15 cm hoch, oberirdische, beblätterte Ausläufer
- Laub dunkelgrün, glänzend, wintergrün
- Blüte weiß, im April – Mai
- ST 2, M 2, GR 2                      WHZ 5
- 12-15 St./m<sup>2</sup> (Foerster)
- Schnitt der alten Blütenstände
- Ränder begrenzen
  
- Deckungsgrad:                      \*\*\*
- Gesundheit:                              \*\*\*
- Winterstruktur:                      \*\* -\*\*\*



*Acaena magellanica*

Syn. *A. glaucophylla*

Blaugraues Stachelnüsschen



Juni 2013



# Acaena magellanica

1999 - 2023

- Patagonien, Feuerland
- 10-15 cm hoch, unterirdische Ausläufer, wintergrün
- zierliche, stahlblaue Blättchen
- unscheinbare Blütenköpfchen Juni-Juli
- stachelige braune Fruchtstände
- FS 1-2, M 1-2, FR 1-2      WHZ 7
- 10-12 St./m<sup>2</sup> (BS Horstmann)
- Ränder begrenzen
  
- Deckungsgrad: \*\*\*
- Gesundheit: \*\*\*
- Winterstruktur: \*



Ostern 2014



# *Pseudolysimachion spicatum* ssp. *incanum*

*Veronica spicata* ssp. *incana*

Silberpolster-Ehrenpreis



Juni 2017



Juni 2019





Juni 2013

## Pseudolysimachion spicatum ssp. incanum

1999 - 2023

- Osteuropa
- schöne silbrige – graufilzige Blätter, wintergrün
- 10/ 30 cm hoch
- Blüte Juni/Juli dunkelblau
- WHZ 3
- FS 1, SH 1, FR 1, ST 1
- 12-15 St./m<sup>2</sup> (Foerster)
  
- Deckungsgrad: \*\*\*
- Gesundheit: \*\*\*
- Winterstruktur: \*



Potentilla aurea

Gold Fingerkraut



Ende April 2010





## Potentilla aurea

1999 - 2020

- Pyrenäen bis Karpaten, Magerrasen, trockene Weiden
- 10-15cm hoch
- 5-7-fach gefingerte Blättchen
- gelbe Blüten mit überlappenden Kronblättern, Mai-Juni
- ST 2, FS 2, FR 2                      WHZ 5
- 9-12 St./m<sup>2</sup> (Foerster)
- Ränder begrenzen
  
- Deckungsgrad: \*\*\*
- Gesundheit: \*\*\*
- Winterstruktur: \*\*



# Globularia cordifolia

Kugelblume







## Globularia cordifolia

2003-2023

- Alpenraum, kalkliebend
- niederliegender Zwergstrauch, 5cm hoch
- Blatt spatelförmig, glänzend dunkelgrün, wintergrün
- kugelige blaue Blütenköpfchen
- 15-25 St./m<sup>2</sup>
- ST 1-2, FS 1-2, M 1-2      WHZ 6
- für kleine Flächen
- Ränder begrenzen
  
- Deckungsgrad:      \*\*\*
- Gesundheit:      \*\*\*
- Winterstruktur:      \*\*\*



# Veronica liwanensis

## Zwerg-Polsterehrenpreis







Juni 2019

## Veronica liwanensis

2009 - 2023

- 5-10cm hoch, teppichartig
- sehr hohe Wuchskraft
- schönes, kleines, rundlich-ovales Blatt, wintergrün
- Blüte Mitte – Ende Mai, mittelblau, sehr reichblühend
- ST 1-2                      WHZ 6
- 20-30 St./m<sup>2</sup> ( BdF Lexikon2023)
- gute Winterhärte, sehr widerstandsfähig

■ Staudensichtung: \*\*\*

■ Deckungsgrad: \*\*\*

■ Gesundheit: \*\*\*

■ Winterstruktur: \*\*





## Veronica 'Eichstetten' *V. officinalis* 'Eichstetten'

2009 - 2023

- 10 - 15cm hoch, polsterförmig
- schönes kräftig grünes, lanzettliches Blatt, wintergrün
- Blüte Mai - Juni, hellblau, reichblütig
- Fr 1-2, GR 1-2      WHZ 3 (*V. officinalis*)
- 16 St./m<sup>2</sup> (Gaißmaier)
- Staudensichtung: ohne Bewertung
  
- Deckungsgrad:      \*\*\*
- Gesundheit:                      \*\*\*
- Winterstruktur:      \*\*





## Veronica x cantiana 'Kentish Pink'

2009 - 2023

- 10-15cm hoch, teppichartig, wintergrün
- Blüte A Juni – Ende Juni, rosa, mäßig blühend
- FR 1-2      WHZ 5
  
- Staudensichtung: \*
- Deckungsgrad: \*\*\*
- Gesundheit: \*\*\*
- Winterstruktur: \*





Bild: Arbeitskreis Staudensichtung

## Veronica 'Blue Reflection'

2009 - 2023

- 10cm hoch, polsterförmig, wintergrün
- Blüte Mitte – Ende Mai, mittelblau, weißes Auge
- FR 1-2
- 20-30 St./m<sup>2</sup>
  
- Staudensichtung: \*\*
- Deckungsgrad: \*\*\*
- Gesundheit: \*\*\*
- Winterstruktur: \*



Gentiana acaulis

Stängelloser Enzian







## Gentiana acaulis


2012 - 2023

- 10cm hoch
- dunkelgrüne Rosetten bilden dichte Bestände
- weiches, breites , wintergrünes Blatt
- kurze Blütenstiele
- Blüte Mai - Juni, dunkelblau, trichterförmig, mit grünen Flecken im Schlund, sehr reichblütig, häufig Nachblüten
- M 2, A 2, ST 2      WHZ 3
- 12-15 St./m<sup>2</sup> (Foerster)
- für kleine Flächen
- saure, humose bis steinig-lehmige Böden
- Deckungsgrad:      \*\*\*
- Gesundheit:      \*\*\*
- Winterstruktur:      \*\*\*



# Schievereckia doerfleri

## Zwerg-Gänsekresse







## Schievereckia doerfleri

2012 - 2023

- kleine, rosettenartige Polster, 5-10 cm, wächst langsam
- Blatt graugrün, wintergrün
- Blüte April – Mai, weiß
- 25- 30 St./m<sup>2</sup>
- verblühte Blüten entfernen
- besser kalkhaltige Böden
- für kleine Flächen
- ST 2, M 2, SF 2                      WHZ 7
- Deckungsgrad:                      \*\*
- Gesundheit:                              \*\*\*
- Winterstruktur:                        \*\*\*



# Thymus longicaulis

Kaskadenthymian







## Thymus longicaulis

2011 - 2023

- Heimat: Süd- und Südosteuropa, Steinrasen, Feinschuttfluren
- buschiger Wuchs, 10-20 cm hoch
- kleine elliptische Blätter, wintergrün
- aromatisch duftend
- Blüte Juni-August, hell-violettrosa, sehr reichblütig
- schnittverträglich
- FS 1, ST 1, M1      WHZ 5
- 9-12 St./m<sup>2</sup> (Foerster)
  
- Deckungsgrad:      \*\*\*
- Gesundheit:      \*\*\*
- Winterstruktur:      \*\*



# Delosperma nubigenum

Lesotho Mittagsblume







## Delosperma nubigenum

2012 - 2023

- Heimat: Lesotho
- bodendeckend , kriechend, dichter Teppich
- 5-10 cm hoch
- ovale, dickfleischige, etwas aufgerichtete Blätter, wintergrün
- Blüte Mai - Juni, gelbe Strahlenblüten, sehr reichblütig
- ST 1          WHZ 8
- 15-20 St./m<sup>2</sup> (Foerster)
  
- Deckungsgrad:      \*\*\*
- Gesundheit:        \*\*\*
- Winterstruktur:    \*\*



# Geranium x cantabrigiense

Cambridge - Storchnabel







## Geranium x cantabrigiense

2012 - 2023

- Bastard aus *G. dalmaticum* und *G. macrorrhizum*
- dichte Teppiche bildend, unterirdische Rhizome
- 20-25 cm hoch
- dunkelgrün, wintergrün, rötliche Färbung im Sommer bei Trockenheit und Winter
- Blüte Mai - Juli, an kurzen, wenig beblätterten Stängeln, rosa (Sorten weiß-rosa)
- FS 1-2, GR1-2, FR1-2, SH 1-2      WHZ 5
- 9-12 St./m<sup>2</sup> (Foerster)
- Deckungsgrad:      \*\*\*
- Gesundheit:      \*\*\*
- Winterstruktur:      \*\*\*



## Zusammenfassung:

- Stauden können langlebig sein
- Standort muss stimmen (Lebensbereich)
- Optimaler Pflanzabstand entscheidet über Bodenschluss und Pflegeaufwand
- Veränderung im Jahr akzeptieren
- Attraktivität durch Blüten und Blattschmuck
- Eingewachsen sehr trockenheitstolerant
- Flächen wenig stören
- Wenig Pflegeaufwand





**„Hast du dich erst einmal mit der  
Welt der Stauden befreundet, so  
kommst du nie mehr von ihr los!“**

**Karl Foerster**