


Wachstumsregler in Wintertriticale

Ergebnisse von 5 Ringversuchen 2014 und 2016



Lagerindex = [prozentualer Anteil der lagernden Fläche] x [Neigung der Halme in Grad] / 100
 Aufwandmengen in l/ha bzw. kg/ha
 Medax Top wurde mit Turbo im Verhältnis 1:1 ausgebracht
 Quelle: Versuche der amtlichen Pflanzenschutzdienste der Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Thüringen

Ratschläge zur sachgerechten Anwendung

| BBCH-Stadium | | | Kosten (€/ha) BayWa 2017 |
|--|--|--|-----------------------------|
| 31 - 32 1-Knoten-Stadium bis 2-Knoten-Stadium | 37 - 39 Fahnenblatt erscheint bis voll entwickelt | 45 - 47 Blattscheide vom Fahnenblatt geschwollen bis geöffnet | |
| geringe Standfestigkeit | | | |
| Trinexapac* 0,4 | - | Cerone 660 0,3 | 32 |
| Medax Top 0,7-0,8 | - | - | 34-37 |
| CCC 1,5 | Medax Top 0,8 | - | 33 |
| | Trinexapac* 0,4 | - | 28 |
| mittlere Standfestigkeit | | | |
| Trinexapac* 0,3-0,4 + CCC 0,8-1,0 | - | - | 20-26 |
| gute Standfestigkeit | | | |
| CCC 1,0 | - | Cerone 660 0,4 | 18 |
| CCC 1,8 | - | - | 7 |

* Calma, Countdown, Modan, Moddus, Moddus Start
 CCC mit 720 g/l Wirkstoffgehalt

Medax Top immer mit Turbo im Verhältnis 1:1
 Aufwandmengen in l/ha bzw. kg/ha

Abteilung Landwirtschaft; Holger Bär

